

# Biovac - ND

Núm. de Registro: B-10575-062

**Vacuna contra la enfermedad de Newcastle.**

## USO EN:



## FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus de la Enfermedad de Newcastle cepa LaSota con un título mínimo de  $10^{8.0}$  DIEP<sub>50%</sub>/mL.



## INDICACIONES:

Vacuna para la inmunización de aves sanas contra la enfermedad de Newcastle.



## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

### Ocular o Nasal ( Solo presentación de 1 000 dosis)

- Retirar el sello de aluminio y el tapón del frasco de la vacuna.
- Reconstituya la vacuna en su diluyente estéril de 30 mL.
- Aplique por instilación ocular o nasal una gota por ave.

### Agua de bebida

- Los bebederos y recipientes utilizados deben estar limpios antes de la aplicación y libres de desinfectantes que puedan inactivar el virus.
- No permitir que las aves tengan acceso al agua durante 1 o 2 horas previas a la vacunación (dependiendo de la temperatura ambiente).
- Retirar el sello de aluminio y el tapón del frasco de la vacuna.
- Hacer una predilución de la vacuna en 15 litros de agua limpia y libre de desinfectantes, posteriormente disolverla en el total de agua a suministrar a las aves durante la vacunación.
- Adicionar al agua leche descremada u otro estabilizador antes de la vacuna.
- Asegurarse de tener suficientes bebederos para que todas las aves beban la solución, se recomienda que el 75% de las aves la consuman simultáneamente.
- Evitar que los bebederos se encuentren expuestos al sol.
- Adicionar la solución de vacuna a los bebederos.
- No suministrar agua a las aves hasta que hayan consumido toda la solución de vacuna. Posterior a la vacunación las aves deben consumir agua limpia y libre de desinfectantes las 24 horas siguientes.

### Aspersión

- Retirar el sello de aluminio y el tapón del frasco de la vacuna.
- Disuelva la vacuna en un diluyente estéril de 250 mL (en presentación de 1 000 dosis)
- Aplique la solución de vacuna por medio de un aparato aspersor directo a las aves.
- Se recomienda el uso de aparatos que generen gotas mayores a 30 micras.

**Intramuscular** (solo presentación de 1 000 dosis)  
-Retirar el sello de aluminio y el tapón del frasco de la vacuna.

-Disuelva la vacuna en 400 mL de diluyente estéril.

-Aplique por vía intramuscular 0.4 mL en aves mayores de una semana.

La vía de aplicación seleccionada está directamente relacionada con la velocidad de la seroconversión en las aves inmunizadas.



## INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

1. Conserve la vacuna entre 2° y 4°C, evitando la congelación.
2. No exponer a los rayos directos del sol.
3. Aplicar la vacuna inmediatamente después de prepararla.
4. No diluir la vacuna más de lo indicado o extender la dosis.
5. No vacune dentro de los 21 días previos al sacrificio.
6. Evite el contacto con los ojos.
7. Después de vacunar incinere los frascos y sobrantes no utilizados.
8. La venta de este producto es solo por Distribuidores autorizados Sanfer Salud Animal que garantizan mantener la cadena fría.
9. No se permite la devolución de este producto al fabricante.
10. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



## PRESENTACIONES:

Frasco con 1 000 dosis.



USO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
© Marca Registrada

**sanfer**<sup>®</sup>  
SALUD ANIMAL