

Helmicin® 12%

Núm. de Registro: Q-10575-020

Antihelmíntico de acción sistémica.
Solución Inyectable.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Levamisol.....120 mg
Vehículo c.b.p..... 1 mL



INDICACIONES:

Para la eliminación de parásitos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. Actúa en formas adultas y fases larvianas en una sola aplicación.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Intramuscular profunda.

Parasitosis gastrointestinal: 1 mL/20 kg de peso vivo.

Parasitosis pulmonar: 1 mL/16 kg de peso vivo.

Bovinos de engorda y productores de leche de más de 300 kg de peso, administrar como máximo 15 mL por sitio de aplicación hasta obtener la dosificación adecuada.

En cerdos de más de 140 kg administrar 7 mL como máximo.

No administrar en cerdos menores de 40 kg.

En problemas de reinfestación, para una segunda administración, a criterio del Médico Veterinario.

Los animales que se van a tratar, deben mantenerse en reposo 2 a 3 horas antes de inyectarlos.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No debe usarse en equinos y caninos. Después de la aplicación, algunos animales pueden presentar síntomas secundarios como vómito, salivación, temblores, incoordinación, con duración de 30 a 60 minutos; recobrándose totalmente. Conserve el frasco bien cerrado a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz.

No se deje al alcance de los niños.

PERIODO DE RETIRO:

Carne y leche: 3 días.



PRESENTACIONES:

Frascos con 100 y 500 mL.



USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca Registrada

sanfer[®]
SALUD ANIMAL