

# Sarrifin® AL

Limpiador y abrillantador de aluminio



## INGREDIENTES :

Agua, ácido fluorhídrico y tensoactivo no iónico.

Sarrifin® AL es un limpiador abrillantador de aluminio y de aleaciones de este. Está formulado con base en ácido fluorhídrico y tensoactivos, para realizar una limpieza profunda en superficies de aluminio. Es ideal para la remoción de manchas de sarro, grasa y óxido acumulado. Sarrifin® AL se recomienda para ser usado en toda superficie de aluminio y de aleación de este como: tolvas que transportan alimento para las granjas, tolvas que sirven para almacén de alimentos, además de máquinas fabricadas con aluminio.



## INSTRUCCIONES DE USO :

Sarrifin® AL. La dosis de uso depende del grado de suciedad en la superficie. Para limpieza de rutina: Emplear de 10 a 25 mL en un litro de agua. La aplicación se realiza con fibra y dejar actuar por 30 segundos, posteriormente se enjuaga con agua. Para limpieza donde hay incrustaciones de sarro y grasa muy acumulada: se puede emplear sin ser diluido. La aplicación puede ser con mochila de aspersión o con fibre. El tiempo de contacto del producto es de 30 segundos a un minuto. Posteriormente enjuagar con agua a presión. En ambos casos se debe usar equipo de protección como guantes de hule, lentes, respirador para vapores de ácidos, camiseta de manga larga, botas de hule.



## PRECAUCIONES :

Sarrifin® AL es un limpiador irritante, corrosivo y tóxico, evite el contacto con la piel, ojos, inhalación e ingestión, en caso de suceder esto, siga las siguientes indicaciones: En PIEL. Aplique crema de magnesio o solución de gluconato de calcio al 10% y enjuague con agua por 15 minutos. En OJOS. Lave inmediatamente con agua corriente de 1 a 3 minutos.

En INHALACIÓN: Retire al afectado de los vapores del producto. Tan pronto sea posible inhalar los vapores de una solución de gluconato de calcio al 2.5%. En INGESTIÓN. No inducir al vómito, no dar al paciente bicarbonato de sodio ni eméticos. Dar al paciente a tomar de uno a tres vasos de agua, posteriormente dar a tomar óxido de magnesio o leche. En todos los casos llame al médico y muéstrele la etiqueta.

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar bajo techo en lugar ventilado, lejos de alimentos. Evite la exposición a la luz del sol directa.



## PRESENTACIONES:

Bidón 20 L.



USO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
© Marca Registrada

**sanfer®**  
SALUD ANIMAL