

Amoxidex® L.A.

Núm. de Registro: Q-10575-050

Suspensión inyectable de larga acción de amoxicilina con dexametasona.

USO EN:



Amoxidex® L.A.- Combinación de la terapéutica antibacteriana que asocia en su fórmula la amoxicilina en forma de trihidrato, considerada como uno de los bactericidas semisintéticos de mayor relevancia (causa lisis en las bacterias Gram positivas y Gram negativas) y dexametasona considerada como el glucocorticoide sintético más potente en su acción anti-inflamatoria (siete a diez veces superior a la prednisolona), ambas suspendidas en una base oleosa de larga duración, para el eficaz tratamiento de infecciones en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Amoxicilina estéril en forma de trihidrato..... 150 mg
Acetato de dexametasona..... 0.51 mg
Vehículo c.b.p.1 mL



INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la amoxicilina en ganado bovino (de engorda y productores de leche), ovino, caprino, porcino, en caninos y felinos.

Es eficaz contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica* y *Corynebacterium spp.*

Se recomienda su uso en las siguientes entidades clínicas: **Bovinos (de engorda y productores de leche):** diarreas y neumonías en becerros, enteritis y septicemia producidas por *Salmonella spp.*, pododermatitis, mastitis por *Escherichia coli*, metritis y retención placentaria, pielonefritis, neumonías e infecciones post-quirúrgicas.

Ovinos y Caprinos: pododermatitis, mastitis, metritis y neumonías. **Porcinos:** enteritis y neumonías asociadas con infecciones por *Escherichia coli*, *Streptococcus suis*, *Salmonella spp.*, *metritis* y Síndrome M.M.A. **Caninos:** Infecciones secundarias asociadas con dermatitis, enteritis, otitis, leptospirosis, faringitis y tonsilitis, heridas post-quirúrgicas, infecciones respiratorias y urogenitales.

Felinos: Infecciones secundarias asociadas con virus respiratorios, enteritis, otitis e infecciones post-quirúrgicas.

Para utilizar Amoxidex® L.A en la prevención de infecciones post-quirúrgicas, debe aplicarse antes de la intervención.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramuscular o subcutánea.

La dosis es de 15 mg/kg de peso corporal con base en la amoxicilina por vía intramuscular o subcutánea, siguiendo precauciones de asepsia.

Se puede repetir la dosis 48 horas después de la primera aplicación, a criterio del Médico Veterinario. De manera práctica, se considera la siguiente dosificación:

BOVINOS (de engorda y productores de leche):

5 mL/50 kg

OVINOS: 1mL/10 kg

CANINOS: 1 mL/10 kg

PORCINOS: 5mL/50 kg **CAPRINOS:** 1 mL/10 kg

FELINOS: 0.5 mL/5 kg

Si el volumen excede los 20 mL, la dosis debe ser dividida y aplicada en dos sitios diferentes.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No se recomienda la aplicación de Amoxidex® L.A por vía endovenosa o intratecal.

Utilizar jeringas perfectamente secas, ya que el producto puede hidrolizarse al entrar en contacto con el agua.

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto y hasta 72 horas después de la última aplicación.

Los animales tratados no deberán ser sacrificados para el consumo humano hasta 14 días después del tratamiento. Conserve el frasco bien cerrado a temperatura ambiente a no más de 30 °C y en lugar seco.

Protéjase de la luz. Agítase antes de usarse.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 14 días. Leche: 72 horas.



PRESENTACIONES:

Frasco con 100 y 250 mL.

MECANISMO DE ACCIÓN

Amoxidex® L.A.- Es un antibiótico betalactámico de efecto bactericida. Se une a receptores específicos de la pared celular bacteriana, permite la activación de enzimas autolíticas que destruyen la bacteria; además, impide la transpeptidación de la pared celular bacteriana, por lo tanto no hay regeneración, lo que causa la destrucción de la bacteria. La dexametasona asociada en su fórmula, rompe con la barrera inflamatoria, permitiendo la penetración adecuada de la amoxicilina al sitio de la infección. Amoxidex® L.A.- Provee concentraciones plasmáticas del principio activo por 48 horas lo que minimiza la necesidad de dosificaciones repetidas.



USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
© Marca registrada.

sanfer
SALUD ANIMAL