

Xelus®

Núm. de Registro: Q-10575-047

Progesterona 1.2 g
Hormonal / Progestina
DISPOSITIVO INTRAVAGINAL PARA BOVINOS

USO EN:



FÓRMULA:

Cada dispositivo intravaginal contiene:
Progesterona (4-pregnano-3,20-diona) micronizada 1.2 g
Excipiente c.b.p.1 dispositivo intravaginal.



INDICACIONES:

Sincronización del celo en vacas y vaquillas. Sincronización de celos para programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intravaginal.

Utilizar un dispositivo por animal. Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en vaquillas).

Utilizando guantes de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0.5 %, realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente. Se sugieren los siguientes protocolos posológicos para cada indicación. Estos pueden modificarse de acuerdo al criterio del Médico Veterinario. Ver cuadro.

	DÍA 00	DÍA 08	DÍA 09	SERVICIO
Sincronización de celo.	Colocar el dispositivo + 2 mg de benzoato de estradiol.	Retirar el dispositivo + 150 µg de D-Cloprostenol (2 mL D-Cloprostenol Sanfer®).		IA: Detectar celo desde el retiro del dispositivo durante 4 días, realizar IA 12 horas posteriores a la detección del celo. Con toros: colocar toros durante 4 días desde el retiro del dispositivo.
Sincronización de celo para IATF.	Colocar el dispositivo + 2 mg de benzoato de estradiol.	Retirar el dispositivo + 150 µg de D-Cloprostenol (2 mL D-Cloprostenol Sanfer®).	1 mg de benzoato de estradiol 24 horas posretiro del dispositivo.	Realizar IATF a las 54 horas de retirado el dispositivo.
Con Cipionato.	Colocar el dispositivo + 2mg de benzoato de estradiol.	Retirar el dispositivo + 150 µg de D-Cloprostenol (2 mL D-Cloprostenol Sanfer®) + 1 mg de cipionato de estradiol (1 mL Cipionato Sanfer®).		Realizar IATF a las 54 horas de retirado el dispositivo.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática. No administrar en animales con endometritis o vaginitis o vulvovaginitis. No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente. No utilizar en animales desnutridos. No utilizar en animales prepúberes. No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conserve a temperatura ambiente a no más de 30 °C y protegido de la luz solar directa. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

TIEMPO DE RETIRO:

0 días.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, INCINERE EL ENVASE Y SOBANTES.



PRESENTACIONES:

Bolsa con 10 dispositivos.



USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO.
© Marca registrada.

sanfer®
SALUD ANIMAL