

# T.B.O. Zoovet®

Núm. de Registro: Q-10575-048

Tilmicosina base 25.0 %  
Bromhexina HCl 0.42 %

Antimicrobiano de amplio espectro  
De uso oral para aves y cerdos

## USO EN:



## FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:  
Tilmicosina base .....25 g  
Bromhexina HCl .....0.42 g  
Vehículo c.b.p. ....100 mL



## INDICACIONES:

Tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la tilmicosina, principalmente infecciones del aparato respiratorio, causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y *Mycoplasma*. Bromhexina actúa como expectorante y mucolítico que coadyuva a la eliminación de secreciones traqueobronquiales.

**Porcinos:** *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

**Aves (engorda):** *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale* y *Pasteurella multocida*.



## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Oral, en el agua de bebida.

**Aves:** En clima frío: Diluir 120 mL del producto en 100 L de agua. Dosis Tilmicosina: 30 mg/kg; Bromhexina: 0.5 mg/kg. En clima caluroso: Debido al mayor consumo de agua de las aves, diluir 60 mL del producto en 100 L de agua. Dosis: Tilmicosina: 30 mg/kg; Bromhexina: 0.5 mg/kg.

**Cerdos:** Diluir 80 mL del producto en 100 L de agua. Dosis: Tilmicosina: 20 mg/kg; Bromhexina: 0.33 mg/kg. Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomiendan entre 3 y 5 días consecutivos. Se recomienda que el médico veterinario ajuste la dosificación a fin de garantizar la medicación adecuada.



## INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

El producto debe ser preparado diariamente con agua potable limpia. Se recomienda suspender el acceso al agua de bebida durante un lapso de tiempo previo a la administración, para asegurar el consumo rápido y total del agua medicada. Si los animales no están en condiciones de ingerir suficiente cantidad de agua por encontrarse debilitados o enfermos, se recomienda la administración previa de tratamientos inyectables. Se recomienda utilizar guantes de látex o goma para manipular el producto (puede ser irritante para la piel). Utilizar asimismo lentes protectores para evitar salpicaduras en los ojos. Lavar las manos luego de su manipulación. La toxicidad en el hombre se produce únicamente por inyección o ingestión accidental. En este caso llamar inmediatamente al médico. No existe antídoto específico. En caso de inyección accidental puede ser cardiotoxica.

Conserve el frasco a temperatura ambiente a no más de 30 °C. Protéjase de la luz. No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los principios activos del producto. No administrar conjuntamente con antibióticos Betalactámicos. No administrar en aves productoras de huevos para consumo humano. No administrar a equinos. Producto muy tóxico para equinos y otros solípedos. **No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.**

## PERIODO DE RETIRO

**Carne:**

**Porcinos:** 14 días.

**Aves:** 12 días.



## PRESENTACIONES:

Frasco de 1L.



USO VETERINARIO  
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
© Marca Registrada

**sanfer**<sup>®</sup>  
SALUD ANIMAL