

Emulmax® C

IBH+ND PLUS

Núm. de Registro: B-10575-065

Virus inactivados y concentrados del SHP, IBH y de la enfermedad de Newcastle emulsionados.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus causante del síndrome del hidropericardio serotipo 4 cepa SHP-IAP/95, virus causante de la hepatitis con cuerpos de inclusión serotipo 8b cepa 5753 y virus vacunal de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, inactivados químicamente, concentrados y emulsionados en adyuvante.



INDICACIONES:

Auxiliar en la prevención del síndrome del hidropericardio, de la hepatitis con cuerpos de inclusión y de la enfermedad de Newcastle en pollo de engorda, ponedoras y reproductoras.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Aplicar 0.2 mL en pollo de engorda a partir de los 7 días de edad.

En ponedoras y reproductoras administrar dos aplicaciones como mínimo antes de la postura.

Subcutánea en pollo de engorda, aplicar en el tercio medio posterior del cuello.

Intramuscular en aves de postura y reproductoras aplicación profunda en pechuga.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente antes de usarlo.

No exponer a los rayos directos del sol. Evite la combinación del producto con otros compuestos como antibióticos u otras vacunas. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL/ 2 500 dosis



USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
©Marca registrada.

sanfer[®]
SALUD ANIMAL