

Genovax[®]

N5 + IB

Núm. de Registro: B-10575-001

Vacuna contra las enfermedades de Newcastle Cepa rP05 (Genotipo V) y de la Bronquitis Infecciosa cepas Massachusetts y Connecticut.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus recombinante atenuado de la Enfermedad de Newcastle cepa rP05 lentogénica (Genotipo V) con un título mínimo de $10^{7.5}$ DIEP_{50%}/mL y de la Enfermedad de Bronquitis Infecciosa cepas Massachusetts y Connecticut con un título mínimo de $10^{4.0}$ DIEP_{50%}/mL.



INDICACIONES:

Vacuna a virus vivo liofilizado para la inmunización de aves sanas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Ocular o Nasal:

- Para su administración diluya cada 1 000 dosis en 30 mL de diluyente estéril de la línea Sanfer (para facilitar la solubilidad se recomienda atemperar el diluyente y la vacuna).
- Administre vía ocular o nasal una gota (0.03 mL) por ave.
- En presentaciones mayores a 2 500 dosis no se recomiendan estas vías de administración.

Agua de bebida:

- Los bebederos y recipientes utilizados deben estar limpios antes de la aplicación y libres de desinfectantes que puedan inactivar al virus.
- Asegurarse de tener suficientes bebederos para que todas las aves beban la solución, se recomienda que el 75% de las aves la consuman simultáneamente.
- Evitar que los bebederos se encuentren expuestos al sol.
- No permitir que las aves tengan acceso al agua durante 1 o 2 horas previas a la vacunación (dependiendo de la temperatura ambiente).
- Retirar el sello de aluminio y el tapón de hule del frasco de la vacuna.
- Adicionar al agua leche descremada u otro estabilizador antes de la vacuna.
- Se recomienda hacer una predilución de la vacuna en un volumen de 15 litros de agua limpia y libre de desinfectantes, posteriormente disolverla en el total de agua a suministrar a las aves durante la vacunación.
- Adicionar la solución de vacuna a los bebederos.
- Se recomienda en la primera toma de la mañana.
- No suministrar agua a las aves hasta que hayan consumido toda la solución de vacuna. Posterior a la vacunación las aves deben consumir agua limpia y libre de desinfectantes las 24 horas siguientes.

Aspersión:

- Retirar el sello de aluminio y el tapón de hule del frasco de la vacuna.
- Disuelva cada 1 000 dosis en un litro de diluyente estéril.
- Aplique la solución de vacuna por medio de un aparato aspersor directo a las aves.
- Se recomienda el uso de aparatos que generen gota gruesa entre 75 y 100 micras.

La vía de aplicación seleccionada está directamente relacionada con la velocidad de la respuesta inmune en las aves vacunadas.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

1. Conserve la vacuna entre 2° y 4°C evitando la congelación.
2. No exponer a los rayos directos del sol.
3. Vacunar únicamente aves sanas.
4. Aplicar la vacuna inmediatamente después de reconstituirla.
5. No diluir la vacuna más de lo indicado o extender la dosis.
6. No vacune dentro de los 21 días previos al sacrificio.
7. Evite la combinación del producto con otros compuestos como antibióticos u otras vacunas.
8. Evite el contacto con los ojos.
9. Después de vacunar incinere los frascos y sobrantes no utilizados.
10. La venta de este producto es solo por Distribuidores autorizados por Sanfer Salud Animal que garantizan mantener la cadena fría.
11. No se permite la devolución de este producto al fabricante.
12. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIONES:

Frasco con 1 000 y 2 500 dosis.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
© Marca Registrada

sanfer[®]
SALUD ANIMAL