

Mastivac

Núm. de Registro: B-0029-001

Bacterina inactivada para la prevención de la mastitis del ganado bovino.

USO EN:



FÓRMULA:

Cantidad por mL:
Staphylococcus aureus..... $\geq 12 \times 10^8$ UFC
Streptococcus agalactiae..... $\geq 9 \times 10^8$ UFC
Streptococcus dysgalactiae..... $\geq 3 \times 10^8$ UFC
Streptococcus uberis..... $\geq 3 \times 10^8$ UFC
Streptococcus pyogenes..... $\geq 3 \times 10^8$ UFC
Escherichia coli..... $\geq 18 \times 10^8$ UFC
Corynebacterium pyogenes..... $\geq 12 \times 10^8$ UFC
Adyuvante 20% del volumen final
Diluyente: Agua de calidad inyectable c.s.p.5 mL
Otros Constituyentes.....Menos de 20 μ g/mL



INDICACIONES:

Prevención de la mastitis bovina.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Con material estéril, se aplicará por vía subcutánea, en el cuello o detrás de la espalda a la siguiente dosis:

Dos inoculaciones de 5 mL cada una, con un intervalo de 15 días entre ellas.

Primovacunación: dos meses antes del parto.

Revacunación: anual.

Tiempo de retiro: 0 días.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conservar el producto entre 2-8 °C. Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz.

Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados en forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.



PRESENTACIONES:

Frasco 100 mL con 20 dosis.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca Registrada

sanfer[®]
SALUD ANIMAL