

DRM Zoovet® 1%

Núm. de Registro: Q-10575-044

Doramectina.

Endectocida en solución inyectable.

Amplio espectro y acción prolongada.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Doramectina 1 g

Vehículo c.b.p. 100 mL



INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de las parasitosis internas y externas en bovinos y ovinos.

En **bovinos**: Parásitos gastrointestinales *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, y *Trichostrongylus spp.*

Miasis: Miasis del ombligo y castración.

En **ovinos**: Parásitos internos: Nemátodos Gastrointestinales: *Teladorsagia spp.* y *Trichostrongylus spp.*, Parásitos externos:

Ácaros de la SARNA: *Psoroptes communis var. Ovis*. Miasis cutánea: Control de la miasis cutánea (gusanera) causada por el estadio larval de la mosca *Cochliomyia hominivorax*, cuando es administrado como preventivo (castración, descole, heridas post-esquila).



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Subcutánea.

Bovinos: 1 mL cada 50 kg de peso vivo (0.2 mg/kg). Aplicar por vía subcutánea en la tabla del cuello por delante o por detrás de la paleta empleando aguja 10/18 y equipo estéril.

Ovinos: 1 mL cada 30 kg de peso vivo (0.3 mg/kg).

Superando los 75 kg, aplicar 1 mL cada 30 kg de peso vivo por vía subcutánea, en la cara interna del muslo o en la quijada por debajo de la apófisis cigomática del maxilar superior. Se sugiere el uso de una aguja de calibre 0.8 x 25 mm de longitud. En dosis única para el control de endoparásitos y como preventivo en la miasis cutánea. Se sugiere realizar análisis coproparasitológico para determinar posibles reinfestaciones.

En el caso de sarna psoróptica 2 aplicaciones con 1 semana de intervalo.

Tabla de dosificación en bovinos

Hasta 50 kg	1 mL
51 – 100 kg	2 mL
101 – 150 kg	3 mL
151 – 200 kg	4 mL
201 – 250 kg	5 mL
251 – 300 kg	6 mL

301 – 350 kg	7 mL
351 – 400 kg	8 mL
401 – 450 kg	9 mL
451 – 500 kg	10 mL
501 – 550 kg	11 mL
551 – 600 kg	12 mL

Tabla de dosificación en ovinos:

Hasta 15 kg	0.5 mL
16 – 30 kg	1 mL
31 – 45 kg	1.5 mL
46 – 60 kg	2 mL
61 – 75 kg	2.5 mL



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conserve el frasco a temperatura ambiente a no más de 30 °C. Protéjase de la luz. No administrar en animales hipersensibles al principio activo. No administrar en animales jóvenes muy debilitados. No administrar en animales productores de leche para consumo humano o su industrialización. No administrar en ovinos durante el periodo de lactancia, ni tampoco dentro de los 60 días anteriores al parto. Los **bovinos** tratados no deberán ser sacrificados para el consumo humano hasta 35 días después del tratamiento. Los **ovinos** tratados no deberán ser sacrificados para el consumo humano hasta 33 días después del tratamiento. El envase debe eliminarse por incineración o enterrándolo ya que la doramectina libre puede contaminar cursos de agua y afectar a los peces y a otros seres acuáticos. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIONES:

Frasco de 50 y 500 mL.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL