

Imidocarb sanfer®

Núm. de Registro: Q-10575-023

Antihematozoario.
Solución inyectable

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Dipropionato de Imidocarb.....120 mg
Vehículo c.b.p.1 mL



INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de piroplasmosis en bovinos de carne y leche, equinos y caninos. En bovinos, *Babesia bovis*, *Babesia bigemina*, en equinos, *Babesia caballi*, *Babesia equi*, en caninos, *Babesia canis*. Tratamiento y control de anaplasmosis en bovinos causada por *Anaplasma marginale*.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Bovinos y caninos: Subcutánea o intramuscular.
Equinos: Intramuscular.

Bovinos: Piroplasmosis dosis única de 1 mL/100 kg de peso vivo. Anaplasmosis una dosis de 2.5 mL/100 kg de peso vivo, puede requerir una segunda dosis.

Equinos: Una dosis de 2 mL/100 kg de peso vivo, si es necesario aplicar una segunda dosis 2 días después.

Caninos: Dosis única de 0.25 mL/10 kg de peso vivo.

La frecuencia y duración del tratamiento son a criterio del Médico Veterinario.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No aplicar simultáneamente con antihelmínticos o en animales que estén en contacto con pulgicidas. En caso de presentar efectos colaterales (salivación, cólico) aplicar atropina. Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, a temperatura inferior a 25°C. No usar en equinos para consumo humano. No se deje al alcance de los niños.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, INCINERE EL FRASCO Y SOBRES.

PERIODO DE RETIRO:
Carne: 90 días Leche: 5 días



PRESENTACIONES:

Frasco con 100 mL.
Caja con 6 frascos de 30 mL c/u.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca Registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL