

Corisan®

Núm. de Registro: B-10575-016

Bacterina bivalente contra Coriza Infecciosa de las aves.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene: 5 billones de *Avibacterium paragallinarum* inactivados: cepa 221 del serogrupo A (serovar A1) y cepa H-18 del serogrupo C (serovar C1). Desarrollada en medio de cultivo. Timerosal como preservativo. Gel de hidróxido de aluminio como adyuvante.



INDICACIONES:

Para la inmunización de las aves sanas contra coriza infecciosa. Actúa contra los serogrupos A y C de *Avibacterium paragallinarum*.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramuscular en pierna.

Aves entre las 5 y 8 semanas de edad: 0.5 mL. Revacunar con 0.5-1 mL entre las 10 y 15 semanas después de la primera aplicación.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conserve en refrigeración entre 2°C y 4°C. Agite antes de usarse. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO INCINERE EL FRASCO Y SOBANTES.



PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
©Marca registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL