

# Bovisec®

Núm. de Registro: Q-10575-039

Combinación antibiótica  
Infusión intramamaria

## USO EN:



## FÓRMULA:

Cada 10 mL contienen:

Penicilina G procaína.....1 000 000 U.I.  
Neomicina base  
(como sulfato de neomicina).....250 mg  
Vehículo c.b.p.....10 mL



## INDICACIONES:

Bovisec® está indicado para la prevención de mastitis durante el periodo seco en bovinos, ovinos y caprinos.



## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramamaria.

Una jeringa en cada cuarto o medio después del último ordeño.



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

### TIEMPO DE RETIRO

No destinar la leche para el consumo humano hasta 4 días después del parto. No destinar para el consumo humano la carne de animales tratados hasta 30 días después de la aplicación del producto.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco a no más de 30°C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.



## PRESENTACIONES:

Cubeta con 30 jeringas de 10 mL c/u.



USO VETERINARIO  
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
© Marca Registrada

**sanfer®**  
SALUD ANIMAL